



# FERMOALE AY4



Levadura seca activa para la producción de cervezas Ale estilo americano o inglés

## → DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Levadura de origen americano muy versátil para la elaboración de cervezas Ale de estilo americano e inglés (ej. APA, IPA, Imperial / Double IPA, Imperial Stout, Imperial Porter, Brown Ale, American Barley Wine, etc.). Tiene una excelente capacidad atenuante, una alta velocidad de fermentación y una floculación media. **FERMOALE AY4** Desarrolla un perfil aromático neutro y limpio con niveles de diacetilo muy bajos.

## → COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Cepa:** *Saccharomyces Cerevisiae*

### Parámetros microbiológicos y físicos:

<b>Células viables</b>	> 5 x 10 <sup>9</sup>	cfu/g
<b>Otras levaduras</b>	< 10 <sup>3</sup>	cfu/g
<b>Hongos</b>	< 10	cfu/ml*
<b>Bacterias Acéticas</b>	< 10 <sup>2</sup>	cfu/ml*
<b>Bacterias Lácticas</b>	< 10	cfu/ml*
<b>Coliforme</b>	< 1	cfu/ml*
<b><i>E.coli</i></b>	< 10	cfu/g
<b><i>Staphylococcus aureus</i></b>	< 10	cfu/g
<b><i>Salmonella spp</i></b>	Ausencia / 25g	cfu/g

\*Con inóculo de 100 g/hL de levadura

Materia seca (%): 95 (+/- 1)  
Densidad: 1,008 g / cm<sup>3</sup>

### Parámetros de producción

Estilos de cerveza: todo tipo de Ale americanas (desde Ale con bajo contenido alcohólico hasta Ale fuertes).  
Muy versátil.

Cinética de fermentación: rápida. 7 días a 22°C, 13 días a 12°C para 12°P.

Rango de temperatura de fermentación: 12-28 C.

Capacidad de floculación y sedimentación: alta

Atenuación aparente: 75-83%\*

\*Mosto de gravedad normal, 12° Plato, 100% malta de cebada


## → DOSIS DE EMPLEO\*

50-80 g / hL de mosto frío a 18-25°C.

## FERMOALE AY4



### PERFIL ORGANOLÉPTICO DE LA CERVEZA CON FERMOALE AY4 (Conforme con ASBC & DLG) 18°P 22°C



#### → FORMA DE EMPLEO

##### Utilización directa de la levadura:

Inocular la levadura directamente en el fermentador a la temperatura de fermentación primaria prevista para la producción de la cerveza deseada.

##### Rehidratación:

Dispersar la levadura en agua esterilizada o mosto a 18-25°C en una proporción de 1:10 y dejar reposar durante 20 minutos. Llevar lentamente a la misma temperatura de fermentación añadiendo mosto a intervalos cortos. Dosificar la masa cremosa de levadura directamente en el fermentador.

##### Opcional:

Utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente, añadir el nutriente **FERMOPLUS® GSH** para mejorar la vitalidad de la levadura.

#### → INFORMACIÓN ADICIONAL

##### Ventajas de usar levadura seca en cervceras

La gestión y propagación de muchas cepas de levadura en el interior de una cervcera representa un punto crítico. El riesgo de contaminación es muy alto, especialmente en la fase de propagación. Por este motivo, el uso de levadura seca activa (LSA) es muy ventajoso: reducción del riesgo microbiológico, fase de latencia corta, disponibilidad de levadura activa en menos de una hora.

#### → CONSERVACIÓN Y CONFECCIÓN\*

Conservar en el embalaje original sellado, lejos de fuentes de luz, en un ambiente inodoro y seco. Conservar preferiblemente a una temperatura inferior a 20°C. No congelar. Usar inmediatamente después de la apertura.

Vida útil: 36 meses

**Paquetes de 500 g netos en cajas de 10 kg**

*\*nota importante: la dosis recomendada puede variar según las condiciones de elaboración seleccionadas por el fabricante. El formato varía según el país de origen. Para cantidades y tamaños exactos, se ruega contactar con nuestros técnicos de ventas o a su fi lial de referencia, varia a seconda del paese di provenienza. Per quantità e formati esatti si prega di contattare i nostri tecnici commerciali o la vostra fi liale di riferimento.*