



A2M/V

.....
 Új tölgyfa alternatívák jellegzetes fás jegyek hozzáadásához

→ LEÍRÁS

Régi hagyomány a fa használata a borok készítésénél: a tartályként való felhasználástól eljutottunk egy valódi és sajátos anyaghoz a borok finomításához és jellegzetesség tételehez. Idővel, a borászati ismeretek és analízisek fejlődésével lehetőség nyílt a fa és az oxigén mechanizmusának elmélyítésére és azok polifenolos anyagokra történő befolyásának megismerésére; mindez világossá tette, milyen fontosak a tölgy származási helyeinek különbségei, a növény életkora, az érlelés típusa és ezek a jellegzetességek hogyan befolyásolják egyértelműen a kezelt bort.

A bor gyártási technológiája és a fogyasztók igényei világszerte kiemelték, hogy az egyik legfontosabb dolog a fa pörkölése, mely közvetlenül befolyásolja az ízt az érlelés folyamán a borba kerülő íz és illatanyagok által.

A chips használata a 80-as években került előtérbe és világosan megmutatta pozitív hatását a kezelt borokra nézve. Egy további fejlődés eredménye az oxigén ellenőrzött alkalmazása, mely lehetővé tette a borászat átformálását néhány technológiát az oxigén és a fa integrált alkalmazásával helyettesítve.

AEB évek óta foglalkozik ezzel a területtel jelentős tapasztalatot szerezve az Európai Unión kívüli országokban, ahol évek óta alkalmazzák ezeket a "fadarabokat"; felismerték, hogy Európában sokkal változatosabb chipsekre van szükség, mint azokban az országokban ahol eddig használták, mivel a művelt szőlők sokfélesége és az ebből adódó kiemelkedően sokféle bor igényei sokkal szélesebb körűek.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Pörkölés: Boisélevage egy szakaszos pirítási módszerrel pörkölt. Ez a legjobbként elismert módszer, lehetővé teszi, hogy a pörkölés egészen belülről hatoljon, a chips szívéig, ezzel homogénné téve a leadást.

A2M/V közepes pörkölésű (M). A chips által nyújtható jellegzetességek intenzitása a pörkölés szintjétől függ.

Tölgy származása: amerikai fa, *Fehér tölgy*. **Érlelés:** szabad levegőn több, mint 10 hónapig. **Eredet:** amerikai tölgyfa Ohio. **Szín:** világos barnától az intenzív barnáig. **Páratartalom:** kevésbé pörköltnél kevesebb, mint 3-4%, pörköltebbnél kevesebb, mint 2-3%.

A2M/V mérete 2 mm.

→ ADAGOLÁS

A Boisélevage adagolása általában 100 és 500 g/hl között változik a kezelendő bor típusától és az íz, illetve az illatérzettől függően, melyet a bornak adni kívánunk. A megfelelő adag kiválasztásához fontos tudni, hogy a 2 mm-es 250 g/hl-es adagolással ugyanakkora felületnek felel meg, mint egy hordóé.





A2M/V

→ ALKALMAZÁS

Közvetlenül adagoljuk vagy infúziós zsákkal adjuk a borhoz.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös és száraz helyen, fénytől és közvetlen hőtől távol.

Nettó 500 g-os csomagok 10 kg-os kartonban.

Nettó 10 kg-os zsákok.

