



FERMOPLUS® SCL

Élesztő származék és cellulóz alapú erjedés aktiváló



→ LEÍRÁS

Fermoplus SCL hosszú láncú cellulóz és élesztő származékok kiegyensúlyozott keveréke; az első összetevő érzékszervileg semleges, garantálja az erjesztés szabályos lefolyását, élesztőkből származó közepes láncú zsírsavak (dekánsav, dodekánsav) szelektív fizikai adszorpciója révén. A második feladata viszont a sejtek táplálása és működésben tartása azon túl, hogy az erjesztés utolsó fázisában segíti a sokszorozódást, mely gyakran drasztikusan lelassul. **Fermoplus SCL** elengedhetetlen tápláló elemeket biztosít az alkoholos erjedés megfelelő lefolyásához, ez egy speciális termék az ammónium-ion hozzáadását követően, mely segíti az erjesztés megfelelő lefolyását a cukrok teljes lebontásáig.

Immár bizonyított a pozitív kölcsönös viszony megléte a mustoknál használt élesztő származékok és a kapott borok aromájának intenzitása és élvezhetősége között mert: megelőzve a redukáló összetevők kialakulását, a borok az erjesztés végén tisztábbak és illatosabbak; az élesztő által az aminosavak lebontásából származó észterek és metabolitok jelentős növekedését eredményezik.

Fermoplus SCL olyan tápanyag, mely minden erjesztésnél használható, de ideális nagy méretű tartályoknál, ahol az erjesztés utolsó fázisa nagyon lelassul, egyes esetekben érzékszervi tökéletlenséget okozva, melyet a későbbiekben javítani kell. Számos erjesztési próba bizonyította, hogy a kezelt borok illó savassága **Fermoplus SCL** használatával alacsonyabb.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

Élesztő sejtfa, élesztő autolizátumok, cellulóz.

→ ADAGOLÁS

20-40 g/hL.

→ ALKALMAZÁS

Hozzáadása erjesztéskor 70-80 g/L cukor lebontása után vagy adjuk közvetlenül a kezelendő termékhez (előtte előnyös feloldani mustban vagy vízben) és tegyük a tartályba.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Hűvös és száraz helyen, távol a közvetlen fénytől és hotól.

Nettó 5 kg-os zsákok.

Nettó 10 kg-os zsákok.

