



STERYL Fusti

.....
Stabilizáló készítmény, amely megakadályozza a virágosodást és gátolja az egyéb baktériumok okozta elváltozásokat
.....

→ LEÍRÁS

A **SteryL Fusti** virágosodás elleni tabletták nagyon tiszta semleges paraffin hordozóból és a benne oldott allil-izoszulfocianáttól áll, amely egy illékony anyag kiemelkedő antiszeptikus képességgel, különösen az aerob mikroorganizmusok ellen.

A **SteryL Fusti** tablettákat előnyösen vazelin olaj (tiltott gyakorlat) vagy töltősapkák helyett használják, hogy elkerüljék a virágosodás megjelenését, amely általában a hordóban tárolt borok felületén hajlamos kialakulni. A virágosodásért felelős mikroorganizmusokat olyan élesztőfajokban azonosították, amelyek túlnyomórészt oxidatív metabolizmussal rendelkeznek.

Ezt a változást az alkoholtartalom csökkenése és az ecetsav-aldehid képződése kíséri, amely felelős a virágosodás által érintett borok acetát illatáért.

A **SteryL Fusti** úszó tabletták lassan bocsátják ki az allil-izoszulfocianátot, amely a bor feletti levegőt sterilé teszi. A virágosodás mellett megakadályozza a felületen megjelenő baktériumok és az oxidatív enzimek általi elváltozásokat is.

A **SteryL Fusti** virágosodás elleni tablettákat a legkorszerűbb, teljesen automatizált ipari folyamatok szerint állítják elő, így garantálva az állandó minőséget.

A csomagolás alumínium és műanyag laminált fólia párosításából áll, amelyek korlátlan tárolási időt biztosítanak, miközben megőrzik a virágosodás elleni hatékonyság jellemzőit az idő múlásával.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

1,7% allil-izoszulfocianát szilárd paraffin hordozóban.

→ ADAGOLÁS

Egy **SteryL Fusti** tabletták a megfelelő edényben (hordók).

→ ALKALMAZÁS

Tegyen egy **SteryL Fusti** tablettát a virágosodástól megóvandó hordóba.

Nagy kapacitású vagy tele tartályok, illetve alacsony alkoholtartalmú borokat tartalmazó edények esetén tanácsos bizonyos számú tablettát hozzáadni esetektől függően.





STERYL Fusti

A **SteryL Fusti** tabletták működésének időtartama a zárórendszeről és a sterilizálandó levegő mennyiségétől függ, ezért a tablettákat meg kell újítani, amikor úgy gondoljuk, hogy működésük befejeződött.

Nyári szezonban vagy magas tárolási hőmérsékleten a tablettákat gyakrabban kell használni.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös és száraz helyen, fénytől és közvetlen hőtől védve.

40 levél 2 tablettával levelenként. Minden tableta körülbelül 7 g.

