



STERYL Vasche

.....
 Stabilizáló készítmény, amely megakadályozza a virágosodást és gátolja az
 egyéb baktériumok okozta elváltozásokat

→ LEÍRÁS

A **SteryL Vasche** virágosodás elleni tabletták nagyon tiszta, semleges paraffin hordozóból és a benne oldott allil-izoszulfocianátból áll, amely egy illékony anyag kiemelkedő antiszeptikus képességgel, különösen az aerob mikroorganizmusok ellen.

A **SteryL Vasche** tablettákat előnyösen vazelin olaj (tiltott gyakorlat) vagy töltősapkák helyett használják, hogy elkerüljék a virágosodás megjelenését, amely általában a tartályban tárolt borok felületén hajlamos kialakulni. A virágosodásért felelős mikroorganizmusokat olyan élesztőfajokban azonosították, amelyek túlnyomórészt oxidatív metabolizmussal rendelkeznek.

Ezt a változást az alkoholtartalom csökkenése és az ecetsav-aldehid képződése kíséri, amely felelős a virágosodás által érintett borok acetát illatáért.

A **SteryL Vasche** úszó tabletták lassan bocsátják ki az allil-izoszulfocianátot, amely a bor feletti levegőt sterilé teszi. A virágosodás mellett megakadályozza a felületen megjelenő baktériumok és az oxidatív enzimek általi elváltozásokat is.

A **SteryL Vasche** virágosodás elleni tablettákat a legkorszerűbb, teljesen automatizált ipari folyamatok szerint állítják elő, így garantálva az állandó minőséget.

A csomagolás alumínium és műanyag laminált fólia párosításából áll, amelyek korlátlan tárolási időt biztosítanak, miközben megőrzik a virágosodás elleni hatékonyság jellemzőit az idő múlásával.

→ ÖSSZETÉTEL ÉS TECHNIKAI JELLEMZŐK

2% allil-izoszulfocianát szilárd paraffin hordozóban.

→ ADAGOLÁS

Egy **SteryL Vasche** tabletták a megfelelő edényben (tartályok).

→ ALKALMAZÁS

Tegyén egy **SteryL Vasche** tablettát a virágosodástól megóvándó tartályba.

Nagy kapacitású vagy tele tartályok, illetve alacsony alkoholtartalmú borokat tartalmazó edények esetén tanácsos bizonyos számú tablettát hozzáadni eseteiktől függően.





STERYL Vasche

A **Steryl Vasche** tabletták működésének időtartama a zárórendszerből és a sterilizálandó levegő mennyiségétől függ, ezért a tablettákat meg kell újítani, amikor úgy gondolják, hogy működésük befejeződött.

Nyári szezonban vagy magas tárolási hőmérsékleten a tablettákat gyakrabban kell használni.

→ TÁROLÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Tárolása hűvös és száraz helyen, fénytől és közvetlen hőtől védve.

50 levél 1 tablettával. Minden tabletták körülbelül 20 g.

