



CHITOCCEL Red

.....
Tratamento específico de estabilização e correção de defeitos
na vinificação em tinto.
.....



→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Chitocel RED é um produto à base de quitosano, taninos proantocianidínicos, preparados de paredes celulares. O quitosano é um polissacárido natural de origem fúngica (*Aspergillus niger*) que permite reduzir e em certos casos eliminar a carga microbiana indesejada. Ativo sobre bactérias acéticas, lácticas, leveduras em geral e *Brettanomyces*, age degradando a parede celular das leveduras e das bactérias eventualmente presentes no meio, causando-lhes a morte. Desempenha assim uma função importante na prevenção e no tratamento de contaminações causadas pelas bactérias lácticas, facilitando o trabalho na adega. Tem ação inibidora sobre bactérias acéticas, auxiliando na obtenção de vinhos com baixos teores em acidez volátil. **Chitocel RED** tem sua aplicação na vinificação em tinto. O quitosano e a proantocianidina trabalham em conjunto e exercem a mesma função do SO₂.

Chitocel RED pela sua ação antimicrobiana é uma excelente alternativa ao SO₂, permite obter vinhos estáveis do ponto de vista microbiológico e em linha com as exigências do mercado que, nos últimos anos, requer produtos com valores de sulfitos sempre mais baixos. Nos vinhos com açúcar residual onde o SO₂ tende a combinar-se mais rapidamente que nos vinhos secos, atua em sinergia com este aditivo.

Chitocel RED, conta na sua complexa composição com a presença de glutatião, proveniente dos derivados de levedura, que auxilia a ação antioxidante do produto. **Chitocel RED** também contribui para a redução de metais pesados como ferro, chumbo, cádmio, cobre prevenindo as casses férrica e cúprica e reduzir eventuais contaminantes como a ocratoxina graças à sinergia com os preparados de paredes celulares de leveduras e os taninos. **Chitocel RED** exerce também uma ação clarificante graças à presença simultânea e sinérgica de quitosano e taninos, neutralizando inclusive a instabilidade proteica.

→ COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paredes celulares de leveduras, Quitosano derivado de *Aspergillus niger*, taninos proantocianidínicos de acácia e quebracho.

→ DOSES A USAR

Nos mostos, principalmente em maceração. De 15 a 60 g/hL consoante os casos.

→ MODO DE APLICAR

Dissolver a dose em mosto ou em vinho e adicionar à massa em remontagem.

→ CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz e do calor direto.

Pacotes de 1 kg em cartões com 5 kg.

